

TRICHODERMA

Fungicida y Fertilizante Biológico

Composición y Concentración

Trichoderma spp 1×10^9 UFC/g

Bioinsumo de alta eficiencia elaborado con cepas de *Trichoderma spp.* actúa de manera preventiva contra hongos fitopatógenos y nematodos que afectan los cultivos agrícolas. Su acción biológica protege tallos, hojas, flores, frutos y raíces, mientras mejora la actividad microbiológica del suelo, acelera la degradación de materia orgánica, optimiza la disponibilidad de nutrientes y fortalece el sistema radicular, favoreciendo plantas más saludables y productivas.

Es eficaz como revitalizador de suelos empobrecidos, ya que favorece el incremento y equilibrio de la microbiología benéfica en la rizósfera, creando un entorno menos propicio para el establecimiento y desarrollo de organismos perjudiciales.



Beneficios

Trichoderma es un hongo saprofito, antagonista de patógenos vegetales que se encuentra presente en la mayoría de los suelos. Activa el crecimiento radicular de las plantas, es capaz de colonizar y crecer en las raíces a medida que éstas se desarrollan y aumenta la resistencia del cultivo frente al ataque de posibles patógenos.

Posee una habilidad especial para colonizar las raíces de las plantas, no dejando nicho ecológico a otros hongos patógenos que intenten infectar la raíz.

Destaca por su potente acción biológica contra una amplia gama de hongos como *Rhizoctonia spp.*, *Fusarium spp.*, *Pythium spp.*, *Botrytis spp.*, *Alternaria spp.*, *Phytophthora spp.*, *Rosellinia spp.*, *Armillaria spp.*, *Sclerotium spp.*, *Colletotrichum spp.*, *Verticillium spp.*, *Cladosporium spp.*, *Cercospora spp.*, *Monilinia spp.*, *Aspergillus spp.*, *Penicillium spp.*, *Macrophomina spp.* y *Lasiodiplodia spp.* Asimismo, contribuye al manejo de nematodos fitoparásitos como *Meloidogyne spp.*

Modo y Dosis de empleo

Cultivo	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Varios	200 gr/200Lt Ha.	Cualquier etapa de desarrollo vegetativo	Vía Edáfica/Drench

Aplicar durante las primeras horas de la mañana o al final de la tarde, evitando periodos de alta radiación solar.

COMPATIBILIDAD

Presenta una alta compatibilidad con la mayoría de insumos fitosanitarios y fertilizantes disponibles en el mercado. Se recomienda evitar la aplicación de fungicidas químicos durante los 15 días previos y posteriores al uso del producto. Se ha demostrado incompatible con los siguientes fungicidas: Benomilo, Imazalil, Propiconazol, Tebuconazol, Triflumizol, Carbendacima y TCMTB.